

【き-5】

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

止瀉薬

赤玉小粒はら薬

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。)
(3) 高齢者。
2. 次の場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
5～6日間服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を、1日3回、食後服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

(1包:30丸)

年齢	1回量
成人(15才以上)	30丸
11才以上15才未満	20丸
8才以上11才未満	15丸
5才以上 8才未満	10丸
3才以上 5才未満	7丸
3才未満	服用させないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

(裏面もお読みください。)

【き-5】

成分・分量 90丸(成人1日量)中

成 分	分量
オウバク末	480mg
ゲンノショウコ末	900mg
ヨウバイヒ末	450mg
エンメイソウ末	450mg
オウレン末	30mg
ゲンチアナ末	100mg
ショウキョウ末	75mg
ダイオウ末	25mg

添加物として米粉、寒梅粉、カルボキシメチルスターチNa、炭酸Ca、マクロゴール、サリチル酸、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ポビドン、三二酸化鉄、赤色102号、黄色5号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1