

かぜの初期症状に 葛根湯内服液

成人1回1本, 1日3回食間に服用してください。
(小児には服用させないでください。)



第2類医薬品

葛根湯内服液

かぜ

の初期症状に

のどの痛み

発熱

さむけ

鼻閉

鼻水

頭痛



かぜの初期症状に…
葛根湯内服液

のどの痛み 発熱 さむけ
鼻閉 鼻水 頭痛

成人1回1本, 1日3回
食間に服用してください。 30mL



かぜの初期症状に

かぜの初期症状に…
葛根湯内服液

のどの痛み 発熱 さむけ
鼻閉 鼻水 頭痛

成人1回1本, 1日3回
食間に服用してください。 30mL

大協葛根湯内服液

押して開ける

30mL×3本

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと

📖 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 (4) 胃腸の弱い人。
 (5) 発汗傾向の著しい人。
 (6) 高齢者。
 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 (8) 次の症状のある人。
 ぶくみ、排尿困難
 (9) 次の診断を受けた人。
 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなり、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
 (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

製造番号

使用期限

〈効能又は効果〉

なぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻閉、鼻水、のどの痛み)

〈用法及び用量〉

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間に服用してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
 (2) 生薬抽出液剤のため沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

〈成分及び分量〉 1日3本(90mL)中

葛根湯抽出液A … 60.0mL

カッコン	8.0g
マソウ	4.0g
タイソウ	4.0g
ケイヒ	3.0g
シヤクヤク	3.0g
カンゾウ	2.0g
シヨウキョウ	1.0g

(葛根湯抽出液A 1mLは原生薬約0.42gに相当する。)

添加物として、精製白糖、D-ソルビトール液、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、カルメロースナトリウム、エチルパニリン、バニリン、香料を含有します。



大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173

¥1,350(¥450×3本)+税

金属:キャップ
ガラス:瓶

製造販売元