

2008年7月改訂

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

**第2類
医薬品**

目のつかれ・目のかすみに

目薬

ニューバードE50

ビタミンE・イプシロン-アミノカプロン酸配合

ニューバードE50は天然型ビタミンEを配合した目薬で、目に栄養を補給し、衰えた目の機能を回復させます。働き盛りの方や目を酷使する仕事をされている方に起こりがちな「目がかすむ」、「目が疲れやすい」、「物がだぶって見える」等の症状に効果を発揮します。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (5)次の診断を受けた人。
緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2)目のかすみが改善されない場合
- (3)5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔用法・用量〕

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
4. ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
5. 点眼用にのみ使用してください。

(必ず裏面もお読みください)

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

【成分・分量】

成分	分量 (100mL中)	はたらき
酢酸d- α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	50mg	抗酸化作用、血行促進作用により、目のかすみ、目の疲れを改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線による眼炎や眼瞼炎の炎症を鎮め、また目のかゆみを抑えます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg	角膜の乾燥を防止し、目のうるおいを保ちます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	3mg	毛様体筋に作用して、目の調節機能を高め、目の疲れ、かすみ目を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみ・炎症を抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により、目の充血を取り除きます。

添加物として、ホウ酸、クエン酸水和物、パラベン、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、 l -メントールを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 他の人と共用しないでください。
- 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室 〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
 電話：076-478-5580 受付時間：9：00～16：00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元

TOA 東亜薬品株式会社
 富山県富山市水橋開発277番10