

胃腸薬:胃痛、胸やけ、飲みすぎなどの症状を改善する、飲みやすい顆粒タイプの緑の胃薬
No40 サクロンG 18包



第2類医薬品

製品の特徴 胃のムカムカや胸やけは、胃酸が出過ぎることによって起こることがあります。また、過度な飲酒によりアルコールが胃粘膜自体を直接刺激することも原因となります。サクロンGは、出過ぎた胃酸の働きを弱め(中和)、分泌を抑制し、キズついた胃粘膜を葉緑素から作られた緑の成分で修復・保護します。

使用上の注意

ムカムカ・胸やけ・飲みすぎに。サクロンGはスーッと飲めば、スーッと効きます。

■してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[関係部位:症状]

皮膚:発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

■その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

効能関連注意

次の量を食間及び就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。

用法・用量

[年齢:1回量:服用回数]

成人(15歳以上):1包:1日3回

8歳以上15歳未満:1/2包:1日3回

8歳未満:服用しないこと

* 食間とは、食後2時間ほど経過し、胃の中に食べた物がほぼなくなっている時です。

小児(8歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

用法関連注意

成分分量

3包(3.69g)中

成分	分量
銅クロロフィリンカリウム	90mg
水酸化マグネシウム	1050mg
無水リン酸水素カルシウム	1650mg
ロートエキス	30mg

添加物

トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、l-メントール、香料、塩化カリウム、ケイヒ、ポビドン

保管及び取扱い
上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- (5) 配置期限をすぎた製品は使用しないでください。

消費者相談窓口

会社名: エーザイ

問い合わせ先: お客様ホットライン

電話: フリーダイヤル0120-161-454

受付時間: 平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00)

その他: ホームページ「胃のサイエンス」では胃の健康に関する情報をお届けしています。 i-no-science.com

胃がスーツとなる緑の胃ぐすり

サクロン[®]G

第2類医薬品

胃のムカムカや胸やけは、胃酸が出過ぎることで起こることがあります。また、過度な飲酒によりアルコールが胃粘膜自体を直接刺激することも原因となります。

サクロンGは、出過ぎた胃酸の働きを弱め(中和)、分泌を抑制し、キズついた胃粘膜を葉緑素から作られた緑の成分で修復・保護します。

ムカムカ・胸やけ・飲みすぎに、サクロンGはスーツと飲めば、スーツと効きます。

●胃の痛み

葉緑素成分配合

●胸やけ

●飲みすぎ



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる】

- ①本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
- ②授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

- ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5)次の症状のある人
排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
- ④2週間間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意



母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

用法・用量

次の量を食間及び就寝前の空腹時に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包 	1日3回
8歳以上15歳未満	½包 	
8歳未満	X 服用しないこと	

* 食間とは、食後2時間ほど経過し、胃の中に食べた物がほぼなくなっている時です。

[用法・用量に関連する注意]

小児(8歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

成人1日量3包(3.69g)中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
銅クロロフィリンカリウム	90mg	荒れた胃の粘膜を修復・保護します
水酸化マグネシウム	1,050mg	出過ぎた胃酸を直接中和します
無水リン酸水素カルシウム	1,650mg	
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、痛みを止めます

[添加物]

トウモロコシデンプン、部分アルファー化デンプン、トメントール、香料、塩化K、ケイヒ、ポビドン

[成分に関連する注意]

服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンカリウム(緑色)が排泄されるための着色であり心配ありません。

ひとくちメモ サクロンGが緑色をしているのは…

胃酸やアルコールで荒れた胃の粘膜を修復・保護するため、サクロンGは葉緑素から作られた緑の成分を含有しています。サクロンGが鮮やかな緑色をしているのはこのためです。

葉緑素
成分
配合

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- ⑤配置期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- イーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



ホームページ「胃のサイエンス」では
胃の健康に関する情報をお届けしています。

i-no-science.com

製造販売元



サンノーバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



イーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10