

※2012年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）


服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

第2類医薬品

5種類の生薬配合
さまざまな胃腸トラブルにお使いいただける胃腸薬

トキワ胃腸薬

さまざまな胃腸のトラブルに対し、総合的に効果をあらわす胃腸薬です。5種類の生薬が弱った胃腸を整え、健康的な胃腸へと導きます。また、持続的に「過剰に分泌された胃酸を中和する」制酸剤をはじめ、「消化を助ける」消化促進剤や、「胃を守る」胃粘膜保護剤、「おなかの痛みをやわらげる」鎮痙剤を配合していますので、幅広い胃腸のトラブルに対応できます。



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
さけてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病、心臓病、線内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - のかわき、便秘、下痢
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効能・効果

胃酸过多、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃重、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、胃痛、胃部不快感、げっぷ(おくび)、消化促進



用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回 朝
11才以上15才未満	2/3包	1回 昼
8才以上11才未満	1/2包	1回 夜
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	× 服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)水またはぬるま湯で服用してください。

成分・分量 1日量(3包)中 1包1,300mg

成 分	分 量	は た ら き
センブリ末	40mg	生薬の特有の苦味が胃の動きをよくして、消化を促進します。
ゲンチアナ末	210mg	
オウバク末	300mg	生薬の特有の苦味が胃の動きをよくし、さらに腸の動きを整えます。
ケイヒ末	600mg	
ウイキョウ油	12mg	生薬の特有の芳香が胃の動きをよくして、消化を促進します。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌をおさえて、胃痛をやわらげる生薬です。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	750mg	速効性・持続性の制酸作用があり、胃の粘膜の炎症面を保護する働きもあります。
炭酸水素ナトリウム	1,130mg	速効性の制酸作用があり、胃酸过多や胸やけなどを改善します。
ビオヂアスターゼ	240mg	胃腸内の広いpH域で働く消化酵素です。糖質やたんぱく質の消化を助けます。
リコレックスA	150mg	胃の粘膜を保護、修復します。
デヒドロコール酸	120mg	胆汁の分泌を促進して、脂質の消化を助けています。

添加物：デキストリン、D-マンニトール、ポビドン、CMC-Na、L-メントール



ワンポイントアドバイス

胃もたれや胃の不快感などの胃のトラブルを早く治すには、消化のよい食事をして胃を休めましょう。アルコールやコーヒー、タバコなどの嗜好品は、胃への刺激となって悪化の原因となりますので、ひかえましょう。また、ストレス解消の工夫をしながら、規則正しい生活を心がけましょう。



〈保管および取扱い上の注意〉

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)冷蔵庫で保管しないでください。
(室温との差により、結露が生じ、品質が変わります。)
- (5)分割して残った薬は、袋の口を折り曲げて保管し、すみやかに服用するか、廃棄してください。
- (6)袋の角がとがっているため、けがをしないよう注意してください。
- (7)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
0120-149-931

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社

お客様相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP